



Raadgevingen bij endodontische behandeling

Een endodontische behandeling gebeurt in twee zittingen:

- eerste zitting: het ontzenuwen
 - de patiënt komt op consultatie met hevige tandpijn of een abces. De tandarts gaat, na verdoving, 90% van de tandzenuw weghalen. Dit betekent dat de overige 10 % nog gevoeligheid kan geven nadat de eerste zitting is afgewerkt. Hiervoor mag u een gewone pijnstillers nemen.
- tweede zitting: het afwerken van de ontzenuwing
 - tijdens deze zitting wordt de rest van de zenuw weggehaald en wordt het zenuwkanaal opgevuld. Dit is een intensieve en tijdrovende behandeling die daarom langer duurt dan andere behandelingen.
 - Opmerking: indien er een zware ontsteking zit op de wortel kan in deze sessie het zenuwkanaal nog niet definitief opgevuld worden. Een ontsmettend middel moet dan worden ingesloten. Na 2 tot 3 weken kan er verder gewerkt worden.

In verband met napijnen is er sprake van 2 mogelijkheden:

- indien de tandzenuw nog niet afgestorven was voor de behandeling, spreken we van een levende tandzenuw. Bij het verwijderen hiervan wordt altijd een klein wondje gemaakt ter hoogte van de wortelpunt. Dit moet spontaan genezen, en kan een paar dagen napijn veroorzaken. Vooral bij bijten op de tand. Indien nodig, kan een gewone pijnstillers zoals NUROFEN, BRUFEN, IBUPROFEN, etc. hier helpen.
- indien de tandzenuw was afgestorven is er vaak sprake van een geïnfecteerd wortelkanaal, en van een chronisch of acuut abces. Het is altijd mogelijk dat de infectie na de behandeling opflakkert. Dit gaat gepaard met pijn en/of zwelling. Deze opflakking is meestal maar eenmalig, en wordt behandeld met een pijnstillers en/of antibioticum. Wanneer we deze reactie kunnen voorzien worden de medicijnen u voorgeschreven.

Een behandeling volgens de regels van de kunst levert niet altijd het gewenste resultaat op. Een groot aantal factoren kan het eindresultaat beïnvloeden. In sommige gevallen kan er zich na een aantal maanden of jaren een herinfectie manifesteren. In dat geval dient de behandeling opnieuw uitgevoerd te worden. Een ontzenuwde tand kan op termijn ook steeds barsten of breken.